

<ヒブワクチン>

接種開始年齢	接種回数	内訳	ワクチンの受け方
生後 2 か月から 7 か月に至るまで	4 回	初回接種 3 回	27 日から 56 日 (医師が必要と認めた場合は 20 日から 56 日) の間隔 で 3 回接種
		追加接種 1 回	3 回目の接種後 7~13 か月までの間隔で 1 回接種
生後 7 か月から 12 か月に至るまで	3 回	初回接種 2 回	27 日から 56 日 (医師が必要と認めた場合は 20 日から 56 日) の間隔 で 2 回接種
		追加接種 1 回	2 回目の接種後 7~13 か月までの間隔で 1 回接種
1 歳から 5 歳 に至るまで		1 回	1 回接種

<小児用肺炎球菌ワクチン>

接種開始年齢	接種回数	内訳	ワクチンの受け方
生後 2 か月から 7 か月に至るまで	4 回	初回接種 3 回	27 日以上の間隔で 3 回接種。ただし、2 回目及び 3 回目の接種は、生後 12 か月までに完了する。(生後 12 か月までに終了できなかった場合は、終了できなかった回数を省略し、追加接種を 1 回接種して下さい。)
		追加接種 1 回	生後 12 か月以降、初回接種後 60 日以上の間隔で 1 回接種。 標準として生後 12 か月から 15 か月に至るまでの間に行う。
生後 7 か月から 12 か月に至るまで	3 回	初回接種 2 回	27 日以上の間隔で 2 回接種(ただし、生後 13 か月までに終了できなかった場合は、2 回目を省略し、追加接種を 1 回接種して下さい。)
		追加接種 1 回	生後 12 か月以降、初回接種後 60 日以上の間隔で 1 回接種。
1 歳から 2 歳 に至るまで	2 回		60 日以上の間隔で 2 回接種
2 歳から 5 歳 に至るまで	1 回		1 回接種